

Số: 06/TB-TTĐVNN

Thanh Hà, ngày 9 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

Tình hình sâu bệnh trên lúa chiêm xuân, cây ăn quả và dự báo trong thời gian tới

Kính gửi: 25 xã, thị trấn trong toàn huyện

I. THỜI TIẾT, CÂY TRỒNG

1. Thời tiết: Trong thời gian qua trời âm u, xen kẽ có mưa rào. Nhiệt độ trung bình 20 - 27⁰C, ẩm độ không khí trung bình 82 - 90%.

2. Cây trồng:

- Lúa chiêm xuân: Các trà lúa đang đứng cái đến làm đòng, một bộ phận đã có đòng già.
- Trên cây vải: Các trà vải đang quả non trà vải sớm đang làm cùi.

II. DIỄN BIẾN SÂU BỆNH:

1. Trên lúa chiêm xuân:

- Chuột: Tiếp tục gây hại các trà lúa. Tỷ lệ đánh bị hại trung bình 1%, nơi cao 3,5%. Diện tích chuột hại khoảng 3ha.

- Bệnh đạo ôn: Gây hại một số giống nhiễm như: TBR225, nếp, Q5, ... Tỷ lệ lá bị nhiễm trung bình 2,5%, nơi cao 10%, có ruộng 20%, cấp bệnh từ cấp 1 đến cấp 3, nơi cao cấp 3 đến cấp 5. Diện tích nhiễm khoảng 15ha như ở các xã Hồng Lạc, Quyết Thắng, Thanh Hải, Tân Việt, ...

- Sâu cuốn lá nhỏ lúa 2: Trưởng thành rải rác vũ hóa từ ngày 04/4, vũ hóa rộ từ ngày 08/4 trở đi. Mật độ trung bình 0,2 con/m², nơi cao 0,5 con/m², có ruộng 1-2 con/m².

- Bệnh khô vằn: Phát sinh gây hại các trà lúa. Tỷ lệ đánh bị nhiễm trung bình 0,5%, nơi cao 3%. Cấp bệnh từ cấp 1 đến cấp 3.

Ngoài ra còn bệnh vàng lụi, sâu đục thân cú mèo,gây hại cục bộ.

2. Trên cây vải:

- Bệnh sương mai: Gây hại nhẹ các trà vải. Tỷ lệ quả bị hại trung bình 3%. nơi cao 8,5%. Cấp bệnh từ cấp 1 đến cấp 3.

- Sâu đo: gây hại quả non các trà vải nhất là trà vải thiếu. Mật độ trung bình 0,1 con/cành, nơi cao 1 con/cành, sâu đa số tuổi 1 đến tuổi 3. Diện tích nhiễm khoảng 50ha.

- Bọ xít: Bọ xít nở gây hại quả non các trà vải. Mật độ trung bình 0,5 con/cành, nơi cao 1,2 con/cành. Diện tích nhiễm khoảng 70ha.

- Sâu đục hạt: Trưởng thành rải rác vũ hóa từ 3/4, vũ hóa rộ từ ngày 07/4 trở đi và đẻ trứng trên các trà vải.

III. DỰ BÁO TRONG THỜI GIAN TỚI:

1. Trên lúa chiêm xuân:

- Chuột: Tiếp tục gây hại các trà lúa.

- Bệnh đạo ôn: Tiếp tục lây lan gây hại các giống nhiễm, đặc biệt gây hại bông một số diện tích lúa trở sớm.

- Sâu cuốn lá lúa 3: Trưởng thành tiếp tục vũ hóa rộ đến ngày 13/4, sâu non nở rộ từ ngày 15/4 trở đi.

- Bệnh khô vằn: Tiếp tục lây lan gây hại các trà lúa

Ngoài ra còn bệnh vàng lụi, sâu đục thân cú mèo, ...

2. Trên cây vải:

- Bệnh sương mai: Tiếp tục lây lan gây hại quả non các trà vải.
 - Sâu đo, bọ xít: Tăng mật độ gây hại quả non.
 - Bệnh thán thư: Nếu thời tiết nắng nóng có mưa ẩm bệnh phát sinh gây hại quả non các trà vải, đặc biệt trà vải thiều.
 - Sâu đục hạt: Trưởng thành tiếp tục vũ hóa rộ đến ngày 11/4, sâu non nở rộ gây hại quả non các trà vải từ ngày 13/4 trở đi, trà vải sớm vải nhỡ sẽ bị gây hại nặng hơn.
- Ngoài ra còn bệnh rụng quả sinh lý, rệp muội,.....

IV. ĐỀ NGHỊ :

1. Trên cây lúa:

- Các xã điều tiết nước phù hợp để các trà lúa làm đồng thuận lợi và đôn đốc các tổ đội diệt chuột đánh bắt chuột. Các hộ nông dân chủ động chăm bón khi lúa đứng cái làm đồng với lượng bón 1kg urê + 3- 4kg Kali/sào (ruộng lúa tốt không nên bón đậm).
- Đối với bệnh đạo ôn: Dùng một trong các loại thuốc sau: Folia 525SE, Fuji-one 40WP, Katana 20SC, Bankan 600WP,...phun phòng trừ khi bệnh chớm xuất hiện. Đối với đạo ôn cổ bông dùng một trong các loại thuốc trên phun phòng cho các giống nhiễm và phải phun kép 2 lần: Lần 1- Khi lúa thấp tho trở, lần 2 khi lúa trở thoát.
- Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Dùng thuốc Virtako 40WG, Regent 800WG, Rholam Super 12EC, Voliam Tago 63SC..., phun từ ngày 15/4 đến ngày 20/4 cho diện tích lúa xanh tốt đang làm đồng.
- Đối với bệnh khô vằn: Dùng Tilt super 300ND hoặc Nevo 330EC, Tiptop 250EC, Anvil 5SC, ... phun phòng trừ khi bệnh chớm xuất hiện.
- Đối với bệnh lem lép hạt: Dùng Tilt super 300ND hoặc Nevo 330EC, Tiptop 250EC, Anvil 5SC, ... phun phòng cho diện tích lúa thấp tho trở.

2. Trên cây vải:


- Giai đoạn quả tạo cùi bón nên bón: 3,5 - 4kg đạm Urê + 4,5 - 5kg Kali/sào và thường xuyên tưới ẩm cho cây.
- Đối với bệnh sương mai: Dùng Ridomin 68 WG, Ricide 72 WP, Antracol 70WP, Carozate 72WP, Dosay 45WP... phun cho các trà vải khi bệnh chớm xuất hiện.
- Đối với bệnh thán thư: Dùng Amistar 250SC, Haohao 600WP hoặc Anvil 5SC, Manage 5WP ... phun phòng trừ khi thấy bệnh chớm xuất hiện.
- Đối với sâu đục hạt: Dùng thuốc Virtako 40WG, Prevathon 5SC, Regent 800WG, ... phun cho trà vải sớm, trà vải nhỡ từ ngày 13/4 đến ngày 17/4.
- Đối với sâu đo: Dùng Dylan 2EC, Pounce 50EC, Peran 50EC, Kinalux 25EC, ... phun trừ khi phát hiện mật độ sâu 0,25con/cành.
- Đối với bọ xít: Dùng Karate 2.5EC, Cyperkill 10EC, Altach 5EC, ... phun trừ khi thấy mật độ bọ xít 1con/cành.

(Chú ý: Khi lúa trở phải phun thuốc vào buổi chiều mát, các hộ nông dân sử dụng các loại thuốc theo đúng chỉ dẫn trên bao bì, không hỗn hợp quá nhiều loại thuốc để phun và luân phiên sử dụng thuốc trong quá trình sử dụng để hạn chế tính kháng thuốc của sâu).

Nơi nhận:

- VP: Huyện uỷ, TT HĐND, UBND huyện;
- Đ/c Bí thư, Phó bí thư huyện uỷ;
- Đ/c Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện;
- Chi cục BVTV; TT khuyến nông tỉnh;
- 25 xã, thị trấn;
- Các phòng ban liên quan;
- Giám đốc HTXDVNN;
- Các hộ KD thuốc BVTV;
- Lưu.

TRUNG TÂM DVNN HUYỆN
GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Cường